



УДК 512.542

EDN: JFHNSG

ЗАМЕТКА О КОНЕЧНЫХ ГРУППАХ С СУБНОРМАЛЬНЫМИ
КОРАДИКАЛАМИ НЕКОТОРЫХ СИЛОВСКИХ НОРМАЛИЗАТОРОВ

А. Ф. Васильев¹, Т. И. Васильева², А. Г. Коранчук¹

¹Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь

²Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, Беларусь

e-mail: formation56@mail.ru, tivasilyeva@mail.ru, melchenkonastya@mail.ru

Поступила: 22.11.2025

Исправлена: 22.11.2025

Принята: 15.12.2025

Ключевые слова: конечная группа, p -силовский нормализатор, субнормальная подгруппа, формация, корадикал, сверхразрешимая группа.

Аннотация. Пусть G – группа и множество простых чисел $\tau(G) = \cup\pi(G : M)$ для любой максимальной подгруппы M из G . Для непустой нильпотентной формации \mathfrak{X} доказано, что группа G имеет нильпотентный \mathfrak{X} -корадикал тогда и только тогда, когда \mathfrak{X} -корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого p из $\tau(G)$.

A NOTE ON FINITE GROUPS WITH SUBNORMAL RESIDUALS OF SOME SYLOW
NORMALIZERS

A. F. Vasil'ev¹, T. I. Vasil'eva², A. G. Koranchuk¹

¹F. Scorina Gomel State University, Gomel, Belarus

²Belarusian State University of Transport, Gomel, Belarus

e-mail: formation56@mail.ru, tivasilyeva@mail.ru, melchenkonastya@mail.ru

Received: 22.11.2025

Revised: 22.11.2025

Accepted: 15.12.2025

Keywords: finite group, p -Sylow normalizer, subnormal subgroup, formation, residual, supersolvable group.

Abstract. Let G be a group and the set of primes $\tau(G) = \cup\pi(G : M)$ for any maximal subgroup M of G . For a non-empty nilpotent formation \mathfrak{X} , it is proved that a group G has a nilpotent \mathfrak{X} -residual if and only if the \mathfrak{X} -residual of the p -Sylow normalizer is subnormal in G for every p from $\tau(G)$.

1. Введение

В заметке под словом группа понимается конечная группа. Пусть p – простое число. Для краткости будем называть p -силовским нормализатором нормализатор силовской p -подгруппы группы и силовским нормализатором нормализатор силовской подгруппы группы. В 1986 г. в [1] была установлена нильпотентность группы, все силовские нормализаторы которой нильпотентны. В 1999 г. А. Баллестер-Болинше и Л. А. Шеметков [2] доказали, что группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор группы G является p -нильпотентным для любого $p \in \pi(G)$. Здесь $\pi(G)$ – множество всех простых делителей порядка группы G .

В работах [1–5] изучались насыщенные формации \mathfrak{F} , содержащие группы, все силовские нормализаторы которых являются \mathfrak{F} -группами. Однако большинство классических формаций не относится к таким формациям. В частности, в симметрической группе степени 4 все силовские нормализаторы сверхразрешимы, но сама группа не является сверхразрешимой.

В дальнейшем \mathfrak{N} – формация всех нильпотентных групп, \mathfrak{A} – формация всех абелевых групп. Для формации \mathfrak{X} через $G^{\mathfrak{X}}$ обозначается \mathfrak{X} -корадикал группы G , т. е. наименьшая нормальная подгруппа группы G , для которой $G/G^{\mathfrak{X}} \in \mathfrak{X}$; $G^{\mathfrak{N}}$ – нильпотентный корадикал G .

В работе [6] были найдены необходимые и достаточные условия, при которых группа со сверхразрешимыми (метанильпотентными, имеющими нильпотентный коммутант) силовскими нормализаторами сверхразрешима (соответственно, метанильпотентна, имеет нильпотентный коммутант). В теореме А [6] было установлено, что для непустой формации \mathfrak{X} , состоящей из нильпотентных групп, необходимыми и достаточными условиями принадлежности группы G формации $\mathfrak{N}\mathfrak{X}$ являются разрешимость p -силового нормализатора и субнормальность в G его \mathfrak{X} -корадикала для любого $p \in \pi(G)$. В теореме В [6] было доказано, что для наследственной насыщенной формации \mathfrak{F} такой, что $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{U}$, тогда и только тогда группа $G \in \mathfrak{F}$, когда p -силовский нормализатор принадлежит \mathfrak{F} и его нильпотентный корадикал субнормален в G для любого $p \in \pi(G)$. Применяя отмеченный выше результат А. Баллестера-Болинше и Л. А. Шеметкова, в работе [7] было установлено, что в достаточных условиях теоремы А разрешимость силовских нормализаторов можно отбросить.

В [8] для группы G через $\tau(G)$ обозначено множество всех простых чисел p таких, что в G найдется максимальная подгруппа M , для которой p делит $|G : M|$, т. е. $\tau(G) = \cup \pi(G : M)$ для любой максимальной подгруппы M из G . Множество $\tau(G)$ не всегда совпадает с множеством $\pi(G)$, как, например, для группы $G = PSL(2, 7)$, в то же время если G – разрешимая группа, то $\tau(G) = \pi(G)$ [8]. Однако из $\tau(G) = \pi(G)$ не всегда следует разрешимость группы G . В качестве примера выступает знакопеременная группа A_5 степени 5, для которой $\tau(A_5) = \{2, 3, 5\} = \pi(A_5)$.

В [8, теорема 1.2] было установлено, что приведенный выше результат А. Баллестера-Болинше и Л. А. Шеметкова верен для любого $p \in \tau(G)$. Это используется в настоящей заметке при доказательстве следующих результатов.

Теорема 1.1. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$. Тогда следующие утверждения эквивалентны.

- (1) Группа $G \in \mathfrak{N}\mathfrak{X}$.
- (2) Любая подгруппа группы G , содержащаяся в $G^{\mathfrak{X}}$, является субнормальной в G .
- (3) $H^{\mathfrak{X}}$ субнормален в группе G для любой подгруппы H из G .
- (4) \mathfrak{X} -корадикал p -силового нормализатора субнормален в группе G для любого $p \in \tau(G)$.

Теорема 1.2. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация, \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация такая, что $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{N}\mathfrak{X}$. Группа $G \in \mathfrak{F}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор группы G принадлежит \mathfrak{F} и \mathfrak{X} -корадикал p -силового нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Приведем несколько следствий. Для $\mathfrak{X} = \mathfrak{N}$ и $\mathfrak{X} = \mathfrak{U}$ из теоремы 1.1 получаются такие результаты соответственно.

Следствие 1.3. Следующие утверждения эквивалентны.

- (1) Группа G метанильпотентна.
- (2) Любая подгруппа, содержащаяся в нильпотентном корадикале группы G , является субнормальной в G .
- (3) Нильпотентный корадикал любой подгруппы группы G субнормален в G .
- (4) Нильпотентный корадикал p -силового нормализатора группы G субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Следствие 1.4. Следующие утверждения эквивалентны.

- (1) Группа G имеет нильпотентный коммутант.
- (2) Любая подгруппа группы G , содержащаяся в G' , является субнормальной в G .
- (3) Коммутант любой подгруппы группы G субнормален в G .
- (4) Коммутант p -силового нормализатора группы G субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Так как пересечение наследственных насыщенных формаций является наследственной насыщенной формацией, из теорем 1.1 и 1.2 вытекает

Следствие 1.5. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация, \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F}$. Группа G принадлежит $\mathfrak{F} \cap \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор группы G принадлежит \mathfrak{F} и \mathfrak{X} -корадикал p -силового нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Следствие 1.6. Пусть \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F}$. Группа G принадлежит \mathfrak{F} и имеет нильпотентный корадикал тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор группы G принадлежит \mathfrak{F} и нильпотентный корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Следствие 1.7. Пусть \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F}$. Группа G принадлежит \mathfrak{F} и имеет нильпотентный коммутант тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор группы G принадлежит \mathfrak{F} и коммутант p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

2. Предварительные сведения

В обозначениях и определениях мы придерживаемся монографий [9; 10].

Теорема 2.1 [8, теорема 1.2]. Группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда для любого $p \in \tau(G)$ нормализатор каждой силовской p -подгруппы группы G является p -нильпотентным.

Лемма 2.2 [10, лемма А.8.6(а)]. Пусть G – группа и π – множество простых чисел. Если K – субнормальная подгруппа группы G и K – π -группа, то $K \leq O_\pi(G)$.

Лемма 2.3 [9, теорема 2.4]. Любая формация, состоящая из нильпотентных групп, является наследственной формацией.

Лемма 2.4 [9, лемма 1.2]. Пусть \mathfrak{F} – непустая формация, K – нормальная подгруппа группы G . Тогда справедливы следующие утверждения:

- (1) $(G/K)^\mathfrak{F} = G^\mathfrak{F}K/K$;
- (2) если $G = HK$ для подгруппы H из G , то $H^\mathfrak{F}K = G^\mathfrak{F}K$;
- (3) если $G = HK$ и $K \leq G^\mathfrak{F}$, то $H^\mathfrak{F}K = G^\mathfrak{F}$.

Приведем известные свойства класса групп с нильпотентным \mathfrak{F} -корадикалом (см., например, [9, с. 36; 10, IV.3, IV.4]).

Лемма 2.5. Пусть \mathfrak{F} – непустая формация. Тогда $\mathfrak{N}\mathfrak{F} = (G \mid G/N \in \mathfrak{F} \text{ для некоторой } N \trianglelefteq G \text{ и } N \in \mathfrak{N}) = \mathfrak{N} \circ \mathfrak{F} = (G \mid G^\mathfrak{F} \in \mathfrak{N})$ – насыщенная формация. Если \mathfrak{F} является наследственной, то и $\mathfrak{N}\mathfrak{F}$ является наследственной.

Лемма 2.6. Пусть \mathfrak{F} – непустая формация и группа $G \in \mathfrak{N}\mathfrak{F}$.

- (1) Любая подгруппа из G , содержащаяся в $G^\mathfrak{F}$, является субнормальной в G .
- (2) Если \mathfrak{F} – непустая наследственная формация, то $H^\mathfrak{F}$ – субнормальная подгруппа в G для любой подгруппы H из G .

Доказательство. В нильпотентной группе любая подгруппа является субнормальной. Поэтому утверждение (1) следует из нильпотентности $G^\mathfrak{F}$ и нормальности $G^\mathfrak{F}$ в G .

(2) Для наследственной формации \mathfrak{F} и любой подгруппы H из G имеем $H^\mathfrak{F} \leq G^\mathfrak{F}$. По утверждению (1) $H^\mathfrak{F}$ – субнормальная подгруппа в G . \square

Лемма 2.7. Пусть \mathfrak{F} – непустая формация, N – нормальная подгруппа группы G . Если \mathfrak{F} -корадикал p -силовского нормализатора группы G субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$, то \mathfrak{F} -корадикал q -силовского нормализатора группы G/N субнормален в G/N для любого $q \in \tau(G/N)$.

Доказательство. Пусть $q \in \tau(G/N)$ и Q/N – силовская q -подгруппа из G/N . Тогда $Q/N = G_qN/N$ для некоторой силовской q -подгруппы G_q из G . По [10, теорема А.6.4(а)] $N_{G/N}(Q/N) = N_G(G_q)N/N$. По лемме 2.4 имеем $N_{G/N}(Q/N)^\mathfrak{F} = (N_G(G_q)N/N)^\mathfrak{F} = N_G(G_q)^\mathfrak{F}N/N$. Так как $q \in \tau(G/N) \subseteq \tau(G)$, $N_G(G_q)^\mathfrak{F}$ субнормален в G . Из свойств субнормальных подгрупп следует, что $N_{G/N}(Q/N)^\mathfrak{F}$ – субнормальная подгруппа в G/N . \square

3. Доказательства теорем 1.1 и 1.2

Установим справедливость теоремы 1.1.

Доказательство. По лемме 2.3 \mathfrak{X} – наследственная формация. Ввиду леммы 2.6 имеем (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3). Очевидно, что из (3) следует (4).

Докажем (4) \Rightarrow (1). Пусть G – группа наименьшего порядка, для которой $N_G(G_p)^\mathfrak{X}$ субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$, а $G \notin \mathfrak{N}\mathfrak{X}$.

I. G – простая группа. Из субнормальности $N_G(G_p)^{\mathfrak{X}}$ в G для $p \in \tau(G)$ следует, что $N_G(G_p)^{\mathfrak{X}} = 1$. Тогда $N_G(G_p) \in \mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$ и по теореме 2.1 получаем противоречие $G \in \mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{N}\mathfrak{X}$.

II. G не является простой группой. Пусть N – минимальная нормальная подгруппа группы G . Из леммы 2.7 следует, что утверждение (4) выполняется для G/N . По выбору G заключаем, что $G/N \in \mathfrak{N}\mathfrak{X}$. Так как $\mathfrak{N}\mathfrak{X}$ – наследственная насыщенная формация, имеем $\Phi(G) = 1$ и N – единственная минимальная нормальная подгруппа группы G . В группе G существует максимальная подгруппа M с $\text{Core}_G(M) = 1$ и $G = NM$. Рассмотрим два случая.

1. G – разрешимая группа. Тогда N – абелева p -группа для некоторого простого p . По [10, теорема А.15.6] $N = C_G(N) = F(G)$, $M \cap N = 1$ и $O_p(M) = 1$. Из $G \notin \mathfrak{N}$ следует, что $|\pi(G)| \geq 2$.

Покажем, что $F(M)$ является p' -холловой подгруппой группы G . Из $M \cong G/N \in \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ и $G \notin \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ следует, что $1 \neq M^{\mathfrak{X}} \in \mathfrak{N}$. Поэтому $M^{\mathfrak{X}} \leq F(M)$. Если $p \in \pi(F(M))$, то силовская p -подгруппа из $F(M)$ нормальна в M , а следовательно, содержится в $O_p(M)$. Из $O_p(M) = 1$ заключаем, что $p \notin \pi(F(M))$, т. е. $F(M)$ – p' -группа. Из $M/F(M) \cong M/M^{\mathfrak{X}}/F(M)/M^{\mathfrak{X}} \in \mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$ следует, что M имеет нормальную p' -холлову подгруппу, которую обозначим через H . Отметим, что H является p' -холловой подгруппой в G .

Возьмем любое $q \in \pi(H)$ и силовскую q -подгруппу H_q из H . Тогда H_q является силовской q -подгруппой в G . Из $q \in \pi(G) = \tau(G)$ следует, что $N_G(H_q)^{\mathfrak{X}}$ – субнормальная подгруппа в G . Ввиду того, что $H_q \cap N_G(H_q)^{\mathfrak{X}} \leq N_G(H_q)^{\mathfrak{X}}$, подгруппа $H_q \cap N_G(H_q)^{\mathfrak{X}}$ субнормальна в G .

По лемме 2.2 $H_q \cap N_G(H_q)^{\mathfrak{X}} \leq O_q(G)$. Из $q \neq p$ и $O_q(G) = 1$ следует, что $N_G(H_q)^{\mathfrak{X}}$ – q' -группа.

Обозначим $S = N_G(H_q)^{\mathfrak{X}}$. Если $N_G(H_q) = H_q S$, то S является нормальной q' -холловой подгруппой в $N_G(H_q)$. Допустим, что $N_G(H_q) \neq H_q S$. Отметим, что $N_G(H_q)/S \in \mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$. Тогда $N_G(H_q)/S = H_q S/S \times L_1/S \times \dots \times L_n/S$, где L_i/S – силовская r_i -подгруппа в $N_G(G_q)/S$ и $r_i \neq q$, $i = 1, \dots, n$. Отсюда следует, что $L_1 \dots L_n$ нормальна в $N_G(G_q)$ и является q' -группой.

Так как $N_G(H_q)$ имеет нормальную q' -холлову подгруппу, $N_H(H_q) = N_G(H_q) \cap H$ имеет нормальную q' -холлову подгруппу. Это означает, что $N_H(H_q)$ является q -нильпотентной подгруппой для любого $q \in \pi(H) = \tau(H)$. По теореме 2.1 группа H нильпотентна. Следовательно, $H = F(M)$.

Значит, $M \leq N_G(H_q)$. Из максимальности M в G и $\text{Core}_G(M) = 1$ заключаем, что $N_G(H_q) = M$. Тогда $N_G(H_q)^{\mathfrak{X}} = M^{\mathfrak{X}}$ – нильпотентная группа и субнормальна в G . По лемме 2.2 $M^{\mathfrak{X}} \leq O_{\pi(H)}(G)$. Так как N – единственная минимальная нормальная подгруппа группы G и N – p -группа, $O_{\pi(H)}(G) = 1$. Получили противоречие с $M^{\mathfrak{X}} \neq 1$.

2. G не является разрешимой. Тогда $|\pi(G)| \geq 3$. Из разрешимости G/N следует, что N не является абелевой группой.

Возьмем любое $q \in \tau(G)$ и силовскую q -подгруппу G_q из G . Тогда $N_G(G_q) \neq G$.

Допустим, что $N_G(G_q)^{\mathfrak{X}} \neq 1$. Обозначим $R = G_q \cap N_G(G_q)^{\mathfrak{X}}$. Тогда $R \leq N_G(G_q)^{\mathfrak{X}}$. Из субнормальности $N_G(G_q)^{\mathfrak{X}}$ в G следует субнормальность R в G . По лемме 2.2 $R \leq O_q(G)$. Ввиду того, что N – единственная минимальная нормальная подгруппа группы G и N неабелева, заключаем $O_q(G) = 1$. Тогда $R = 1$ и $N_G(G_q)^{\mathfrak{X}}$ – q' -группа. Из $N_G(G_q)/N_G(G_q)^{\mathfrak{X}} \in \mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$ следует, что $N_G(G_q)$ имеет нормальную q' -холлову группу, т. е. $N_G(G_q)$ q -нильпотентен.

Если $N_G(G_q)^{\mathfrak{X}} = 1$, то $N_G(G_q)$ нильпотентен.

По теореме 2.1 получаем противоречие $G \in \mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{N}\mathfrak{X}$, которое завершает доказательство. \square

Докажем теорему 1.2.

Доказательство. Необходимость. Пусть $G \in \mathfrak{F}$. Для любого $p \in \tau(G)$ из наследственности \mathfrak{F} следует, что $N_G(G_p) \in \mathfrak{F}$. По лемме 2.6(2) $N_G(G_p)^{\mathfrak{X}}$ – субнормальная подгруппа в G .

Достаточность. Предположим, что утверждение неверно. Пусть G – группа наименьшего порядка такая, что $N_G(G_p) \in \mathfrak{F}$, $N_G(G_p)^{\mathfrak{X}}$ – субнормальная подгруппа в G для любого $p \in \tau(G)$, а $G \notin \mathfrak{F}$. По теореме 1.1 группа $G \in \mathfrak{N}\mathfrak{X}$, а значит, разрешима.

Пусть N – минимальная нормальная подгруппа из G . Из $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F}$ следует, что G не является циклической группой, порядок которой есть простое число. Значит, N – абелева p -группа для некоторого простого p . Для любого $q \in \tau(G/N)$ и силовской q -подгруппы Q/N из G/N найдется силовская q -подгруппа G_q из G такая, что $Q/N = G_q N/N$. Так как $q \in \tau(G/N) \subseteq \tau(G)$, по условию $N_G(G_q) \in \mathfrak{F}$. Откуда $N_{G/N}(Q/N) = N_G(G_q)N/N \cong N_G(G_q)/N_G(G_q) \cap N \in \mathfrak{F}$. Ввиду леммы 2.7 для G/N все условия теоремы выполнены. По выбору G получаем, что $G/N \in \mathfrak{F}$.

Так как \mathfrak{F} – насыщенная формация, заключаем, что N – единственная минимальная нормальная подгруппа из G и $\Phi(G) = 1$. Тогда $G = NM$ для некоторой максимальной в G подгруппы M . Так как G разрешима и $\text{Core}_G(M) = 1$, по [10, теорема А.15.6] $N = C_G(N) = F(G)$, $M \cap N = 1$ и $O_p(M) = 1$. Ввиду нильпотентности $G^{\mathfrak{X}}$ имеем $G^{\mathfrak{X}} \leq F(G)$. Если $G^{\mathfrak{X}} = 1$, то $G \in \mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{F}$. Это противоречит выбору G . Значит, $G^{\mathfrak{X}} = N$. Тогда $G/N \cong M \in \mathfrak{X}$. Если $p \in \pi(M)$, то в M силовская p -подгруппа является нормальной и содержится в $O_p(M) = 1$. Это противоречие показывает, что $p \notin \pi(M)$. Тогда N – силовская p -подгруппа в G . Так как G разрешима, $p \in \pi(G) = \tau(G)$, по выбору G имеем $G = N_G(N) \in \mathfrak{F}$. Полученное противоречие завершает доказательство теоремы. \square

4. Заключение. Связь с известными результатами

Теоремы 1.1 и 1.2 для разных формаций \mathfrak{X} и \mathfrak{F} позволяют получать как новые, так и известные результаты. Теорема 1.1 убирает в достаточных условиях теоремы А из [6] разрешимость силовского нормализатора и уменьшает число силовских p -подгрупп, рассматривая их только для $p \in \tau(G)$. Так как $\tau(G) \subseteq \pi(G)$, из теоремы 1.1 получаются следующие результаты.

Следствие 4.1 [6, теорема А]. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$. Группа $G \in \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор разрешим и \mathfrak{X} -корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \pi(G)$.

Следствие 4.2 [7, теорема 1]. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$. Группа $G \in \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ тогда и только тогда, когда \mathfrak{X} -корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \pi(G)$.

Ввиду того, что $\tau(G) \subseteq \pi(G)$, из теоремы 1.1 вытекает теорема 2 из [11].

Положив $\mathfrak{X} = \mathfrak{N}$, соответственно $\mathfrak{X} = \mathfrak{A}$, из теоремы 1.2 следуют два таких результата.

Следствие 4.3. Пусть \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{N}^2$. Группа $G \in \mathfrak{F}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор принадлежит \mathfrak{F} и нильпотентный корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Следствие 4.4. Пусть \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{N}\mathfrak{A}$. Группа $G \in \mathfrak{F}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор принадлежит \mathfrak{F} и коммутант p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Обозначим через \mathfrak{D} формацию всех дисперсивных по Оре групп. Так как \mathfrak{D} является наследственной насыщенной формацией, из следствия 1.5 вытекает

Следствие 4.5. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация, \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{D}$. Группа $G \in \mathfrak{F} \cap \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор принадлежит \mathfrak{F} и \mathfrak{X} -корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Из принадлежности \mathfrak{D} всех силовских нормализаторов из G не всегда следует, что $G \in \mathfrak{D}$ [7].

Следствие 4.6. Пусть \mathfrak{X} – непустая формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$. Группа $G \in \mathfrak{D} \cap \mathfrak{N}\mathfrak{X}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор дисперсивен по Оре и \mathfrak{X} -корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Так как $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{U} \subseteq \mathfrak{N}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{N}^2$ для формации \mathfrak{U} всех сверхразрешимых групп, теорема 1.2 является развитием следующего результата.

Следствие 4.7 [6, теорема В]. Пусть \mathfrak{F} – наследственная насыщенная формация и $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{U}$. Группа $G \in \mathfrak{F}$ тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор принадлежит \mathfrak{F} и нильпотентный корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \pi(G)$.

Если $\mathfrak{F} = \mathfrak{U}$, то из теоремы 1.2 получается

Следствие 4.8. Если \mathfrak{X} – непустая формация и $\mathfrak{X} \subseteq \mathfrak{N}$, то группа G сверхразрешима тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор сверхразрешим и \mathfrak{X} -корадикал p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Отсюда при $\mathfrak{X} = \mathfrak{N}$ и $\mathfrak{X} = \mathfrak{A}$ соответственно вытекает

Следствие 4.9. Группа G сверхразрешима тогда и только тогда, когда p -силовский нормализатор сверхразрешим и нильпотентный корадикал (коммутант) p -силовского нормализатора субнормален в G для любого $p \in \tau(G)$.

Исследования первого и второго авторов выполнены при поддержке Министерства образования Республики Беларусь (грант № 20211750 «Конвергенция-2025»), исследования третьего автора выполнены при поддержке БРФФИ (проект Ф23РНФМ-63).

Литература

1. Bianchi M., Gillio Berta Mauri A., Hauck P. On finite soluble groups with nilpotent Sylow normalizers // *Arch. Math.* 1986. Vol. 47, N 3. P. 193–197.
2. Баллестер-Болинше А., Шеметков Л. А. О нормализаторах силовских подгрупп в конечных группах // *Сиб. матем. журн.* 1999. Т. 40, № 1. С. 3–5.
3. D’Aniello A., De Vivo C., Giordano G. Saturated formations and Sylow normalizers // *Bull. Austral. Math. Soc.* 2004. Vol. 69, N 1. P. 25–33.
4. D’Aniello A., De Vivo C., Giordano G., Pérez-Ramos M. D. Saturated formations closed under Sylow normalizers // *Commun. Algebra.* 2005. Vol. 33, N 8. P. 2801–2808.
5. Kazarin L., Martínez-Pastor A., Pérez-Ramos M. D. On Sylow normalizers of finite groups // *J. Algebra Appl.* 2014. Vol. 13, N 3. Art. 1350116–1–20.
6. Васильева Т. И., Коранчук А. Г. Конечные группы с субнормальными корадикалами силовских нормализаторов // *Сиб. матем. журн.* 2022. Т. 63, № 4. С. 805–813.
7. Монахов В. С. О нильпотентных корадикалах силовских нормализаторов конечной группы // *Сиб. матем. журн.* 2025. Т. 66, № 4. С. 683–688. <https://doi.org/10.33048/smzh.2025.66.410>
8. Lu J., Meng W. Finite groups with certain normalizers of Sylow subgroups // *J. Algebra Appl.* 2019. Vol. 18, N 6. Art. 1950101 (4 p.).
9. Шеметков Л. А. Формации конечных групп. М.: Наука, 1978. 272 с.
10. Doerk K., Hawkes T. *Finite soluble groups.* Berlin; New York: Walter De Gruyter, 1992. 898 p.
11. Монахов В. С. Конечные группы с дисперсивными силовскими нормализаторами // *Матем. заметки.* 2025. Т. 118, № 5. С. 769–778.

References

1. Bianchi M., Gillio Berta Mauri A., Hauck P. On finite soluble groups with nilpotent Sylow normalizers. *Arch. Math.*, 1986, vol. 47, iss. 3, pp. 193–197.
2. Ballester-Bolinches A., Shemetkov L. A. On normalizers of Sylow subgroup in finite groups. *Siberian Mathematical Journal*, 1999, vol. 40, iss. 1, pp. 1–2.
3. D’Aniello A., De Vivo C., Giordano G. Saturated formations and Sylow normalizers. *Bull. Austral. Math. Soc.*, 2004, vol. 69, iss. 1, pp. 25–33.
4. D’Aniello A., De Vivo C., Giordano G., Pérez-Ramos M. D. Saturated formations closed under Sylow normalizers. *Commun. Algebra*, 2005, vol. 33, iss. 8, pp. 2801–2808.
5. Kazarin L., Martínez-Pastor A., Pérez-Ramos M. D. On Sylow normalizers of finite groups. *J. Algebra Appl.*, 2014, vol. 13, iss. 3, art. 1350116–1–20.
6. Vasilyeva T. I., Koranchuk A. G. Finite groups with subnormal residuals of Sylow normalizers. *Siberian Mathematical Journal*, 2022, vol. 63, iss. 4, pp. 670–676.
7. Monakhov V. S. On nilpotent residuals of Sylow normalizers of a finite group. *Siberian Mathematical Journal*, 2025, vol. 66, iss. 4, pp. 986–990.
8. Lu J., Meng W. Finite groups with certain normalizers of Sylow subgroups. *J. Algebra Appl.*, 2019, vol. 18, iss. 6, art. 1950101 (4 p.).
9. Shemetkov L. A. *Formations of finite groups.* Moscow, Nauka, 1978. 272 p. (in Russian).
10. Doerk K., Hawkes T. *Finite soluble groups.* Berlin, New York, Walter De Gruyter, 1992. 898 p.
11. Monakhov V. S. Finite groups with dispersive Sylow normalizers. *Mathematical Notes*, 2025, vol. 118, iss. 5, pp. 716–718 (in Russian).